

Escala de severidad  
de la

Pudrición  
del cogollo  
(PC)



en palmas de vivero



MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

PROSPERIDAD  
PARA TODOS



**El grado de severidad de la PC en una palma se debe evaluar en la flecha más joven, con más de 30 cm de largo, considerando el costado de la flecha que presenta la mayor afección.**

**Según el área afectada se catalogan así:**

**Grado 0**



Carece de lesiones, la flecha muestra vigor y sanidad

Grado 1



Las lesiones ocupan desde el 0,1 % hasta el 20 % del área de la flecha

Grado 2



Las lesiones ocupan desde el 20,1 % hasta el 40 % del área de la flecha

Grado 3



Las lesiones ocupan desde el 40,1 % hasta el 60 % del área de la flecha

Grado 4



Las lesiones ocupan desde el 60,1 % hasta el 80 % del área de la flecha

Grado 5



Las lesiones ocupan desde el 80,1 % hasta el 100 % del área de la flecha

## Cráter



El proceso de emisión de flechas se ha interrumpido, las palmas carecen de tejidos jóvenes

Fotos: Gerardo Martínez López

**Las medidas de control de los casos de la Pudrición del cogollo se deben iniciar, en lo posible, antes que se llegue al grado de severidad 3, para aumentar la posibilidad de una recuperación satisfactoria de la palma enferma**

*“Se deja expresa constancia de que el presente contenido constituye las recomendaciones que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas, de tal manera que sin perder su rigor y experticia, no podrían entenderse como garantía absoluta ni asegurar un resultado concreto, dada las especificidades propias de cada caso”.*

