

Escala de Severidad de la Pudrición de Cogollo



Señor palmicultor mida periódicamente la incidencia y la severidad de la PC en su cultivo.

Recuerde

incidencia, se denomina al porcentaje de palmas enfermas frente a un número total de palmas sembradas.



Severidad : corresponde al porcentaje de afectación en una misma palma.



CENIPALMA

desarrolló una escala de severidad en la que se explica cómo identificar el daño ocasionado por



esta escala muestra **siete** estados de la palma (de 0 a cráter) y **cinco grados** de evaluación, basados en el daño externo de la cara más afectada y de la flecha que mida mínimo 30 centímetros de largo.

ESTADOS DE LA PALMA



0



}

Carece de lesiones, la flecha muestra vigor y sanidad

1



}

Las lesiones ocupan desde el 0,1 % hasta el 20% del área de la flecha

2



}

Las lesiones ocupan desde el 20,1% hasta el 40% del área de la flecha

3



}

Las lesiones ocupan desde el 40,1 % hasta el 60% del área de la flecha

4



}

Las lesiones ocupan desde el 60,1% hasta el 80% del área de la flecha

5



}

Las lesiones ocupan desde el 80,1% hasta el 100% del área de la flecha

cráter




}

El proceso de emisión de flechas se ha interrumpido, las palmas carecen de tejidos jóvenes.

Las medidas de control de los casos de la pudrición del cogollo se deben iniciar en lo posible, antes de que la planta llegue al estado de severidad 3, para aumentar la posibilidad de una recuperación satisfactoria de la palma enferma



Si mide la severidad podrá tomar decisiones oportunas.



Si en su predio identifica **grados de severidad** realice la remoción de tejidos enfermos de manera oportuna.

1
2
3

Finalmente, si el proceso de emisión de flechas se ha interrumpido y las palmas carecen de tejidos jóvenes se considera estado de Cráter. En este estado es recomendable eliminar la palma.

