



# Juntos contra la #FiebreAmarilla

La prevención está en la palma de tu mano

## Todo lo que todo lo que debes saber sobre la fiebre amarilla

### ¿Qué es la fiebre amarilla?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Puede causar fiebre, ictericia (color amarillo en ojos y piel), sangrados y, en algunos casos, ser mortal.



### ¿Quiénes deben vacunarse y por qué?

Todas las personas **mayores de 9 meses** deben aplicarse una **\*Única dosis\*** de la vacuna, incluida la población **mayor de 59 años**. La vacuna es clave para prevenir la enfermedad y evitar brotes.



*Todos los empleados de la Federación que deban viajar a zonas de alto riesgo deben contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. En caso de no haber recibido la vacuna, deberán acudir a un punto autorizado para aplicársela. Este requisito es obligatorio para realizar el viaje.*

### ¿La vacuna es segura?

**Sí.** Es segura, gratuita y salva vidas.

Brinda **\*inmunidad del 99 % en 30 días\*** y se ha usado por décadas para prevenir la fiebre amarilla.



### ¿Cuándo comienza a ser efectiva la vacuna?

A partir del día décimo después de haber sido aplicada y alcanza un **99 % de inmunidad en un plazo de 30 días**.

### ¿Dónde y cómo vacunarse en Colombia?

Puedes vacunarte en cualquier punto de vacunación del país, sin importar tu nacionalidad o afiliación al sistema de salud. ¡La vacuna es de acceso libre!

Consulta aquí los puntos de vacunación.

### ¿Cómo saber si ya me vacuné?


Acude a un punto de vacunación o revisa tu historial en [Mi Vacuna - Fiebre Amarilla] (<https://mivacuna.sispro.gov.co>).

Si no hay registro, puedes diligenciar una declaración ante el Ministerio de Salud.

### Si me aplique la vacuna, pero no tengo ninguna evidencia, ¿qué debo hacer?

Hay que acercarse a la **IPS** a la que se encuentra afiliado o a un **punto de vacunación** más cercano, para verificar si hay registro de la vacuna en un sistema oficial. Si no se encuentra y se tiene la certeza de haberla recibido, se podrá diligenciar un formato del **Ministerio de Salud y Protección Social** para declarar que ya ha sido vacunado.

El ministerio indicará cómo hacerlo y dará los lineamientos necesarios.



### ¿Se contagia de persona a persona?

**No.** La fiebre amarilla **no se transmite entre personas** Solo se contagia por la picadura de mosquitos infectados.



### ¿Cuáles son las zonas de riesgo y qué deben hacer los viajeros?

Las zonas cálidas y húmedas con bosques fragmentados son de alto riesgo. Si vas a viajar a estos municipios, vacúnate **al menos 10 días antes**.

### Síntomas

- Fiebre
- Dolor muscular
- Náuseas y/o vómito
- Dolor de cabeza
- Dolor abdominal
- Pérdida del apetito
- Color amarillo en las conjuntivas
- Hemorragias nasales
- Pérdida del apetito
- Ojos rojos
- Sensibilidad a la luz



### Contraindicaciones

Esta contraindicada en las siguientes condiciones:

- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, por ejemplo, antecedentes de timentomía, leucosis, linfomas, procesos neoplásicos o en terapia de larga evolución con corticoides, antineoplásicos o radioterapia, así como en personas afectadas de infección por el VIH.
- Alergia grave a la proteína del huevo; en caso de aplicarse, puede presentarse urticaria, exantema y crisis de bronquitis asmática (un caso por millón).
- Reacción anafiláctica previa a la vacuna.
- Haber recibido vacunación para cólera o fiebre tifoidea en las tres semanas previas.
- Mujeres en estado de gestación y mujeres en lactancia, hasta el año de edad del bebé.
- Las personas con trastornos del timo o inmunodeficiencias graves.
- Personas de 60 años y más.
- No se debe administrar simultáneamente las vacunas contra la Fiebre Amarilla y el cólera.
- Presencia de enfermedad febril aguda.

Consúltalo aquí:



La Federación ha establecido un protocolo para promover el cuidado y combatir esta enfermedad, este documento oficial contiene las medidas que todos debemos implementar.

